

Novità

# Amadene® Fert



- › Concime organico azotato: miscela di concimi organici azotati. Carniccio fluido in sospensione
- › Indicato per l'impiego su Olivo, Agrumi e altri Fruttiferi
- › Consentito in Agricoltura Biologica per trattamenti localizzati su parte della chioma\*
- › Miscelabili con i principali formulati fitosanitari (insetticidi e fungicidi)

## COMPOSIZIONE

azoto (N) totale 7%  
 azoto (N) organico 6,5%  
 carbonio (C) organico 20%

## FORMULAZIONE

liquido solubile

## DENSITÀ

1.200 g/l



## SETTORI DI IMPIEGO

Tipo di applicazione	Dose	Epoca d'intervento
<b>Treatments fogliari</b>		
Olivo	1-2 l/ha (1,2-2,4 kg/ha) in 100-200 litri d'acqua (concentrazione 1%) per trattamenti fogliari localizzati su parte della chioma, prestando attenzione ad evitare le parti edibili della coltura (Agricoltura Biologica)	Da post-allegagione a invaiatura a intervalli di 15 gg
Agrumi		
Drupacee (Ciliegio, Pesco, Albicocche, Susino)		
Pomacee (Melo, Pero)		
Actinidia		
Noce		
Piccoli Frutti		
<b>Fertirrigazione</b>		
Olivo	4-8 l/ha in fertirrigazione	Da frutticino (1-2 cm di diametro) a intervalli di 15 gg
Agrumi		
Drupacee (Ciliegio, Pesco, Albicocche, Susino)		
Pomacee (Melo, Pero)		
Actinidia		
Noce		
Piccoli Frutti		

\* Non applicabile alle parti commestibili della coltura



**TANICA**  
 6,3 kg (pari a 5 l)  
 (cartone 4 pz)

## AVVERTENZE

Si consiglia di eseguire test preliminari di applicazione su alcune varietà di susino sensibili all'azione degli amminoacidi. Non miscelare con prodotti rameici (ad esclusione dell'olivo). Conservare a temperature comprese tra 4°C e 28°C.