




Campo dimostrativo Diachem 2026

Caravaggio (BG)

02.07.2026 | CONFIDENTIAL


Dati meteo 2026 (maggio-giugno)

Caravaggio (BG)



Dati meteo 2026 (giugno-luglio)

Pagazzano (08-12 giugno) Caravaggio (13 giugno – 01 luglio)



Principali caratteristiche delle varietà

DRAGONE F1

Descrizione:

Ibrido caratterizzato dalla pianta vigorosa, coprente e sana. Il frutto presenta colore rosso intenso ed alto Brix; ottima la consistenza e lo spessore della polpa. Consigliato per il mercato fresco, la preparazione di pelati e per la polpa a cubetti.



cv. Dragone F1
Costitutore: Panora S.p.A.



KENNEBEC

Descrizione:


Ciclo medio-tardivo; pianta con pochi steli, fioritura scarsissima e fiori bianchi; tuberi tondeggianti, molto grossi, con occhi superficiali, buccia chiara, pasta bianchissima, di buon sapore, piuttosto farinosa.



Mappa del campo



Agricola2000
Services & Research for Agriculture



Soil: argilloso-limoso (argilla 39%, limo 30%, sabbia 31%)



POMODORO: Strategia Fungicida

Agricola2000®
Services & Research for Agriculture



TIMING	DIACHEM			REFERENCE	
	PRODOTTI	S.A.	DOSE	S.A.	DOSE
A = 20/05/2026	DIA 120 F	Rame da TBCS (25 g/l)	2 l/ha	Rame da Poltiglia Bordolese (20%)	3,75 kg/ha
B = 29/05/2026	FOLTAN 50 SC DIA 120 F	Folpet (500 g/l) Rame da TBCS (25 g/l)	0,5 l/hl 2 l/ha	Folpet (500 g/l) Rame da Poltiglia Bordolese (20%)	0,5 l/hl 2 l/ha
C = 05/06/2026 Da sviluppo vegetativo	CUMETA FLOW	Metalxil-m (24 g/l) + Rame da TBCS (200 g/l)	4 l/ha	Metalxil-m (28,5 g/l) + Rame da Idrossido (215 g/l)	3,5 l/ha
D = 12/06/2026 Da fioritura	DIA 126 F	Iprovalicarb (120 g/l) + Cyazofamid (100 g/l)	0,8 l/ha	Mandipropamide (250 g/l) Amisulbrom (200 g/l)	0,6 l/ha 0,6 l/ha
E = 19/06/2026 Da inizio allegagione	CUMETA FLOW	Metalxil-m (24 g/l) + Rame da TBCS (200 g/l)	4 l/ha	Metalxil-m (2%) + Rame da Ossicloruro (14,19%)	5 kg/ha
F = 26/06/2026 Allegagione	DIA 126 F	Iprovalicarb (120 g/l) + Cyazofamid (100 g/l)	0,8 l/ha	Mandipropamide (250 g/l) Amisulbrom (200 g/l)	0,6 l/ha 0,6 l/ha
-	CUMETA FLOW	Metalxil-m (24 g/l) + Rame da TBCS (200 g/l)	4 l/ha	Metalxil-m (2%) + Rame da Ossicloruro (14,19%)	5 kg/ha
-	DARAMUN DIA 120 F	Cyazofamid (100 g/l) Rame da TBCS (25 g/l)	0,8 l/ha 2 l/ha	Zoxamide (240 g/l) Rame da Poltiglia Bordolese (20%)	0,7 l/ha 3,75 kg/ha
Trapianto: 08/05; Inoculo <i>P. infestans</i> : 01/06 + oospore 09/06; PAMPERO (60 ml/ha) Vs. Dorifera 11/06	KOP-TWIN	Rame da TBCS (180 g/l) + Rame da Idrossido (120 g/l)	1,6 l/ha	Rame da Poltiglia Bordolese (20%)	3,75 kg/ha

PATATA Strategia Fungicida



TIMING	DIACHEM			REFERENCE	
	PRODOTTI	S.A.	DOSE	S.A.	DOSE
A 05/06/2026	AXIDOR	Propamocarb (400 g/l) + Cimoxanil (50 g/l)	2,5 l/ha	Propamocarb (450 g/l) Mandipropamide (75 g/l)	1,9 l/ha
B 12/06/2026	DIA 120 F KELSOS	Rame TBCS (25 g/l) Fluazinam (500 g/l)	2 l/ha 0,4 l/ha	Poltiglia bordolese (20%) Fluazinam (500 g/l)	3,75 kg/ha 0,4 l/ha
C 18/06/2026	DIA 126 F	Cyazofamid (100 g/l) + Iprovalicarb (120 g/l)	0,8 l/ha	Mandipropamide (250 g/l) Zoxamide (240 g/l)	0,6 l/ha 0,7 l/ha
D 26/06/2026	DIA 120 F KELSOS	Rame TBCS (25 g/l) Fluazinam (500 g/l)	2,8 l/ha 0,4 l/ha	Poltiglia bordolese 20% Fluazinam (500 g/l)	3,75 kg/ha 0,4 l/ha
-	CUMETA FLOW	Metalaxyl-m (24 g/l) + Rame TBCS (200 g/l)	4 l/ha	Metalxil-m (28,5 g/l) + Rame da idrossido (215 g/l)	3,5 l/ha
-	DIA 126 F	Cyazofamid (100 g/l) + Iprovalicarb (120 g/l)	0,8 l/ha	Mandipropamide (250 g/l) + zoxamide (240 g/l)	0,6 l/ha 0,7 l/ha
-	CUMETA FLOW	Metalaxyl-m (24 g/l) + Rame TBCS (200 g/l)	4 l/ha	Copper Oxychloride 14,19% + Metalaxyl-m 2%	5 kg/ha
-	DARAMUN DIA 120 F	Cyazofamid (100 g/l) Rame TBCS (25 g/l)	0,8 l/ha 2 l/ha	Zoxamide (240 g/l) Bordeaux mixture 20%	0,7 l/ha 3,75 kg/ha
-	KOP-TWIN	Rame TBCS (180 g/l) + Rame da idrossido (120 g/l)	1,6 l/ha	Rame ossicloruro (136 g/l) + Rame idrossido (136 g/l)	0,5 l/hl

Semina: 13/05/2026; PAMPERO (60 ml/ha) Vs. Dorifora 11/06/2026

LINEA NUTRIZIONALE POMODORO & PATATA




TIMING	TRATTAMENTI ESGUITI SULL'INTERO CAMPO SPERIMENTALE
Pomodoro (12 gg DA-A) Patata (7 gg DA-A) 20/05/2026	STIMUTER (5 l/ha) + BIO-D (2 l/ha) Fertirrigazione
29/05/2026 (9 DA-B)	STIMUTER (5 l/ha) + BIO-D (2 l/ha) + IRON 4 (2 l/ha) Fertirrigazione
05/06/2026 (7 DA-C)	AMINOMIX PLUS (2,5 l/ha) + AZN (1 l/ha) Fogliare
12/06/2026 (7 DA-D)	AMINOMIX PLUS (2,5 l/ha) + AZN (1 l/ha) + PENTACALCIUM (1 l/ha) Fogliare
18/06/2026 (6 DA-E)	AMINOMIX PLUS (2,5 l/ha) + BIO-D (2 l/ha) + PENTACALCIUM (1 l/ha) Fogliare

LINEA NUTRIZIONALE POMODORO & PATATA



TIMING	TRATTAMENTI ESGUITI SULL'INTERO CAMPO SPERIMENTALE
23/06/2026 (5 DA-F)	DIGRAMON GREEN (20 kg/ha) + Solfato di Potassio (20 kg/ha) + IRON 4 (2 l/ha) Fertirrigazione AMINOMIX PLUS (3 l/ha) + AZN (3 l/ha) + ATONIK (1 l/ha) + PENTACALCIUM (1 l/ha) Fogliare
26/06/2026 (3 DA-G)	ACTIFLUID B (3 l/ha) + BIO-D (3 l/ha) Fertirrigazione AMINOMIX PLUS (3 l/ha) + AZN (3 l/ha) + ATONIK (1 l/ha) + PENTACALCIUM (1 l/ha) Fogliare
-	Nitrato ammonico (30 kg/ha) + Zolfo bagnabile (3 kg/ha) + STIMUTER (5 l/ha) Fertirrigazione AMINOMIX PLUS (3 l/ha) + AZN (3 l/ha) + ATONIK (1 l/ha) + PENTACALCIUM (1 l/ha) Fogliare

STRATEGIA NUTRIZIONALE POMODORO & PATATA: Fertilità del suolo



TIMING	TESI DIACHEM 1	TESI DIACHEM 2
09/06/2026	Prelievo campioni suolo	
10/06/2026 Da fioritura	GL CALCIPHOS 9-64-0 + 11 CaO (10 kg/ha) SPERIMENTALE (20 l/ha)	GL CALCIPHOS 9-64-0 + 11 CaO (10 kg/ha) SINERGIZER (5 l/ha)
18/06/2026 Fioritura/Inizi o allegagione	GL CALCIPHOS 9-64-0 + 11 CaO (10 kg/ha) SPERIMENTALE (20 l/ha)	GL CALCIPHOS 9-64-0 + 11 CaO (10 kg/ha) SINERGIZER (5 l/ha)

Diserbo – Rapidità d'azione

- Diserbo totale
- Data del trattamento: 16/06/2026
- Target: infestanti (Sorghetta da rizoma)

4	2
2	3
4	1
1	3

1. Glifene Biograde +DIA 101 ADJ
2. Glifene+Iron 4
3. Glifene Biograde
4. Roundup Power 2.0

TESI	PRODOTTI	DOSI
1	Glifene Biograde (glifosate 360 g/l) + DIA 101 ADJ	4 l/ha + 0,5 l/ha
2	Glifene Biograde (glifosate 360 g/l) + IRON 4	4 l/ha + 1 l/ha
3	Glifene Biograde (glifosate 360 g/l)	4 l/ha
4	Roundup Power 2.0 (glifosate 360 g/l)	4 l/ha



Grazie

diachemagro.com

