IL DISERBO POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO

INFESTANTE	CARATTERISTICHE
 **GRAMINACEE ANNUALI** *Lolium* spp., *Avena sterilis, Poa* spp., *Alopecurus myosuroides*	Annuali a rapido sviluppo Sensibili in giovani stadi Molte specie presenti
 **CRUCIFERE** *Capsella bursa-pastoris, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum*	Dicotiledoni annuali Germinazioni scalari Sviluppo rapido
 **ASTERACEAE** *Matricaria* sp., *Chrysanthemum* spp., *Sonchus arvensis*	Nascite autunno-primaverili Crescita a rosetta Elevata produzione di semi
 **DICOTILEDONI COMUNI** *es. Polygonum* sp., *Chenopodium album, Fumaria officinalis, Solanum nigrum, Stellaria media,* ecc.	Ampio gruppo di annuali Nascite scalari Sensibili in giovani stadi
 **CONVOLVOLO** *Convolvulus arvensis*	Pianta perenne Radice profonda rizomatosa Difficile da controllare
 **GALIUM** *Galium aparine*	Fusti rampicanti e uncinati Favorisce l'allettamento Ostacola la trebbiatura
 **RUMEX** *Rumex crispus*	Pianta perenne Radice a fittone Difficile da controllare
 **VERONICA** *Veronica persica*	Annuale a nascite scalari Portamento prostrato Fioritura prolungata

PRODOTTO CONSIGLIATO
 **MARKER WG** (Mesosulfuron-metile + Iodosulfuron-metil sodio + mefenpir-dietile) +  **KINVARA ME** (Fluroxipir + clopiralid + MCPA da sale)

Miscela completa MARKER WG + KINVARA ME in post-emergenza



IRON 4
1 l/ha
Azione acidificante e rinverdente

+



MARKER WG
0,5 kg/ha

+



KINVARA ME
2 l/ha

+



VECTOR
Coadiuvante
1 l/ha
Solfoniluree e ormonici

Adattamento delle dosi in base alla situazione

- **Infestazioni difficili:** impiegare KINVARA ME alla dose massima di etichetta (3 l/ha).
- **Gestione delle resistenze:** allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti adottare idonee pratiche agronomiche (es. rotazione colturale, falsa semina) ed alternare o associare prodotti con diverso meccanismo d'azione.

Evitare di trattare con sbalzi termici ed eventualmente aggiungere STIMUTER 5 l/ha

Consigli per un trattamento efficace

Fase del frumento
Da accestimento a inizio levata

Infestanti
Giovani, in attiva crescita

Temperatura ideale
10-25°C

Miscibilità
Ottima compatibilità con formulati Agrofarmaci (es. FIRUZA) e Agronutrienti (es. IRON 4 e STIMUTER)

Acqua
200-400 l/ha

Ugelli
Antideriva, buona copertura

Inquadra il QRcode e scopri le linee tecniche di Diachem per la difesa e la nutrizione del Frumento.

diachemagro.com

DIACHEM®
We *embrace* agriculture

I prodotti presenti sono autorizzati dal Ministero della Salute. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo.